

FICHE D'INFORMATION :
LE DEGAGEMENT D'UNE DENT INCLUSE

Le principe

- Le dégagement d'une dent incluse concerne le plus souvent une canine de la mâchoire supérieure. C'est une intervention préconisée chez l'enfant et l'adulte jeune lorsqu'une dent ne parvient pas à sortir naturellement de la mâchoire. Elle risque alors de rester définitivement dans l'os et créer des troubles esthétique et des troubles de l'occlusion (alignement des dents).
- On réalise une incision de la gencive dans la zone du palais le plus souvent et après décollement, on enlève si besoin l'os autour de la dent.
- L'intervention se termine par le collage sur la dent d'un dispositif de traction qui sera relié à l'appareillage orthodontique existant. Ainsi l'orthodontiste appliquera régulièrement une traction pour aider la dent à sortir.

Avant l'intervention

- Le bilan préopératoire comportera un examen clinique complété par un bilan radiographique (radiographie panoramique). Un scanner sera éventuellement demandé.
- L'arrêt du tabac la semaine précédant l'acte opératoire et pendant le mois qui suit est préférable.

Type d'anesthésie

- L'intervention est réalisée le plus souvent sous anesthésie locale.

Suites opératoires

- Les suites opératoires à envisager sont liées au décollement de la gencive. Un œdème est habituel parfois associé à des ecchymoses des joues dont l'importance et la durée sont très variables d'un individu à l'autre.
- Les douleurs post opératoires sont aussi très variables d'un individu à l'autre en fonction du type d'intervention (2 ou 4 dents extraites)

Le traitement post-opératoire comportera habituellement une hygiène buccale très stricte et un traitement anti douleur

Complications envisageables

- Il n'existe pas de complication majeure à ce type d'intervention. On peut toutefois citer comme dans toute intervention de chirurgie buccale le risque d'infection en post opératoire qui même faible reste réel.
- Le dispositif peut se décoller et nécessiter alors une seconde intervention pour le coller à nouveau
- Dans de très rares cas, la traction est inefficace et la dent restera incluse.

Je vous conseille de conserver ce document. Cette lecture suscitera peut-être de nouvelles questions. Je suis à votre disposition pour en reparler lors d'une prochaine consultation.

Docteur Thierry Caro Chirurgien Dentiste
Bâtiment Europa 3 - 74, rue Louis Rustin - Archamps Technopole - 74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex
Tél : +33 (0)450 92 05 00 - Fax +33(0)4 50 92 67 59 - www.dr-caro-chirurgien-dentiste.fr

En cas d'urgence tel : 06 09 92 50 61

Mail : dr.caro@dentistes-archamps.com