

FICHE D'INFORMATION :
LA GREFFE GINGIVALE

Le principe

- En cas de perte de tissu gingival ou si la gencive est trop fine on pratiquera une greffe gingivale. C'est une intervention préconisée pour renforcer le tissu de soutien de la dent. Elle est demandée pour des raisons esthétiques et fonctionnelles.
- Le greffon est prélevé dans la gencive dans la zone du palais.
- Le greffon est ensuite positionné sur la zone dénudée ou à renforcer et fixé par des sutures.
- Pose d'une gouttière palatine pour protéger le palais.
- La cicatrisation primaire est obtenue en 10 jours. Les fils sont alors déposés. La cicatrisation définitive et l'aspect final sont obtenus au bout de quelques mois.

Avant l'intervention

- Le bilan préopératoire comportera un examen clinique complété par un bilan radiographique éventuellement.
- L'arrêt du tabac la semaine précédant l'acte opératoire et pendant le mois qui suit est indispensable.
- Préparation d'une plaque palatine (protection du palais).

Type d'anesthésie.

- L'intervention est réalisée sous anesthésie locale.

Suites opératoires

- Les suites opératoires à envisager sont liées au décollement de la gencive au niveau du palais. Un œdème est habituel parfois associé à des ecchymoses des joues dont l'importance et la durée sont très variables d'un individu à l'autre.
- Les douleurs post opératoires sont aussi très variables d'un individu à l'autre.
- Le traitement post-opératoire comportera habituellement une hygiène buccale très stricte et un traitement anti douleur.

Complications envisageables

- L'échec de la greffe est la complication majeure. Si la vascularisation du greffon ne s'effectue pas dans de bonnes conditions, celui-ci se nécrose. Le résultat est donc le retour à la situation initiale.
- Il n'existe pas de complication majeure à ce type d'intervention. On peut toutefois citer comme dans toute intervention de chirurgie buccale le risque d'infection en post opératoire qui même faible reste réel. Un retard de cicatrisation du site de prélèvement entraînera aussi des douleurs au niveau du palais pendant 10 jours.

Je vous conseille de conserver ce document. Cette lecture suscitera peut-être de nouvelles questions. Je suis à votre disposition pour en reparler lors d'une prochaine consultation.

Docteur Thierry Caro Chirurgien Dentiste
Bâtiment Europa 3 - 74, rue Louis Rustin - Archamps Technopole - 74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex
Tél : +33 (0)450 92 05 00 - Fax +33(0)4 50 92 67 59 - www.dr-caro-chirurgien-dentiste.fr

En cas d'urgence tel : 06 09 92 50 61

Mail : dr.caro@dentistes-archamps.com